



Olimpiada de Fizică
Etapa pe județ
24 februarie 2007
Barem

XI

Pagina 1 din 4

Subiect	Parțial	Punctaj
1. Barem subiect 1		10
a) Mișcarea centrului de masă este rectilinie uniformă $\vec{v}_{CM} = \frac{\vec{p}_0}{2M+m} = ct$	2p	2p
b) Mișcarea relativă a corpurilor este armonică. Ecuatia de mișcare este : $\mu_r \vec{a}_r = -k \cdot \vec{x}$ unde $\mu_r = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ este masa redusă a sistemului Soluția ecuației este: $x(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$, iar viteza $v(t) = \omega A \cos(\omega t + \varphi)$ unde $\omega = \sqrt{\frac{k}{\mu_r}}$ deci $\omega = \sqrt{\frac{k(2M+m)}{M(M+m)}}$	0.5 0.5 0.5 0.5	4 p
Din condițiile inițiale se determină φ și A : La $t=0$, $x=0$, deci $\varphi=0$, $v_{max} = \omega A$, $v_{max} = \frac{p_0}{M}$, deci $A = \frac{p_0}{M\omega}$ $A = p_0 \sqrt{\frac{(M+m)}{kM(2M+m)}}$	0.5 0.5	
Ecuatiile mișcării și ale vitezei sunt: $x(t) = p_0 \sqrt{\frac{(M+m)}{kM(2M+m)}} \sin\left(\sqrt{\frac{k(2M+m)}{M(M+m)}} t\right)$	0.5	
$v_r(t) = \frac{p_0}{M} \cos\left(\sqrt{\frac{k(2M+m)}{M(M+m)}} t\right)$	0.5	
Condiția cerută este ca $A < l_0$, adică $p_0 < l_0 \sqrt{\frac{k(2M+m)}{(M+m)}}$	0.5	
c) Deducerea accelerării corpului 2 :		3p
$\vec{a}_{CM} = 0$, relația implică $M\vec{a}_1 + (M+m)\vec{a}_2 = 0$, știind că $\vec{a}_r = \vec{a}_1 - \vec{a}_2$ Rezultă $\vec{a}_2 = -\frac{M}{2M+m}\vec{a}_r$		1,5
Pentru condiția		
$F_f \geq m a_{2max} - \frac{mM}{2M+m} a_{rmax}$	1p	
$\mu_{min} = \frac{p_0}{g} \sqrt{\frac{k}{M(M+m)(2M+m)}}$	0,5	
OFICIU		1p

- Orice rezolvare corectă ce ajunge la rezultatul corect va primi punctajul maxim pe itemul respectiv.
- Orice rezolvare corectă, dar care nu ajunge la rezultatul final, va fi punctată corespunzător, proporțional cu conținutul de idei prezent în partea cuprinsă în lucrare din totalul celor ce ar fi trebuit aplicate pentru a ajunge la rezultat, prin metoda aleasă de elev.



Olimpiada de Fizică
Etapa pe județ
24 februarie 2007
Barem

XI

Pagina 2 din 4

Subiect	Parțial	Punctaj
Oficiu		10
2. Barem subiect 2		
a. Pentru expresia energiei transmise elementului de masă Δm la distanța r de sursă este $\Delta W = \frac{4\pi}{2} A_{(r)}^2 \omega^2$ Pentru expresia intensității undei : $I_{(r)} = \frac{\Delta W}{S \cdot \Delta t} = \frac{\rho \cdot 4\pi r^2 dr}{2 \cdot 4\pi r^2 dt} = \frac{\rho \cdot c}{2} A_{(r)}^2 \omega^2$ Pentru prag $A_{prag} = \frac{1}{\omega} \sqrt{\frac{2 I_{prag}}{\rho \cdot c}}$	1p 1p 0.5p	2.5 p
b. Pentru relația dintre $I_{(r)}$ și P : $P = I_{(r)} \cdot S = 4 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot I_{(r)} = 2 \cdot \pi \cdot \rho \cdot c \cdot \omega^2 \cdot A_{(r)}^2 \cdot r^2$ De unde $A_{(r)} = \frac{1}{\omega \cdot r} \sqrt{\frac{P}{2 \cdot \pi \cdot \rho \cdot c}} = \frac{\text{const}}{r}$ Pentru ecuația undei sferice sinusoidale progresive $y(r, t) = \frac{1}{\omega \cdot r} \sqrt{\frac{P}{2 \cdot \pi \cdot \rho \cdot c}} \sin \omega \left(t - \frac{r}{c} \right)$	1p 0.5p 1p	2.5 p
c. Amplitudinea undei rezultante $A_M^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos \frac{\omega(r_2 - r_1)}{c} = \frac{P}{2 \cdot \pi \cdot \rho \cdot c \cdot \omega^2} \left(\frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} + \frac{2}{r_1 r_2} \cos \frac{\omega \cdot \delta}{c} \right)$ unde $r_2 - r_1 \equiv \delta \approx 2 \cdot d \cdot \sin \theta \approx 2 \cdot d \cdot \theta$ iar $\frac{1}{r_1^2} \approx \frac{1}{r_2^2} \approx \frac{1}{r_1 r_2} \approx \frac{1}{r^2}$ Expresia finală a amplitudinii $A_M^2 = \frac{2 \cdot P}{\pi \cdot \rho \cdot c \cdot \omega^2 \cdot r^2} \cos^2 \left(\frac{\omega \cdot d}{c} \theta \right)$ Expresia intensității în M $I_{M(r, \theta)} = \frac{P}{\pi \cdot r^2} \cos^2 \left(\frac{\omega \cdot d}{c} \theta \right)$ Delfinul receptor „simte” maximele și minimele alternante ale intensității: $I_M = \max \Leftrightarrow \cos^2 \left(\frac{\omega \cdot d}{c} \theta \right) = 1 \Rightarrow \theta_k = k \cdot \frac{\pi \cdot c}{\omega \cdot d}, k \in N$ $I_M = \min \Leftrightarrow \cos^2 \left(\frac{\omega \cdot d}{c} \theta' \right) = 0 \Rightarrow \theta'_k = \left(k + \frac{1}{2} \right) \cdot \frac{\pi \cdot c}{\omega \cdot d}, k \in N$	1p 0.5p 0.5p 0.5p 0.5p 0.5p 1p	4p
OFICIU	1p	

-
1. Orice rezolvare corectă ce ajunge la rezultatul corect va primi punctajul maxim pe itemul respectiv.
 2. Orice rezolvare corectă, dar care nu ajunge la rezultatul final, va fi punctată corespunzător, proporțional cu conținutul de idei prezent în partea cuprinsă în lucrare din totalul celor ce ar fi trebuit aplicate pentru a ajunge la rezultat, prin metoda aleasă de elev.



Olimpiada de Fizică
Etapa pe județ
24 februarie 2007
Barem

XI

Pagina 3 din 4

Subiect 3.	Parțial	Punctaj
Barem subiect x		10
<p>a) Locul geometric al punctelor în care se află locul produceri cutremurului față de un observator care înregistrează intervalul de timp $\Delta t_{sp} = t_s - t_p$ (între momentele receptiunii celor două tipuri de unde seismice), este, potrivit simplificărilor considerate, o sferă. Proiecția sferei pe suprafața Pământului reprezintă un cerc pe care se poate afla epicentru cutremurului</p> <p>Calculul distanței: din $\Delta t_{ps} = \frac{d}{v_s} - \frac{d}{v_p} \Rightarrow d = \Delta t_{ps} \cdot \frac{v_s v_p}{v_p - v_s}$</p> <p>$d_{It} = 656\text{ km}$ $d_{Gr} = 800\text{ km}$ $d_{Ro} = 520\text{ km}$</p> <p>Figură</p>	1 p 1 p 1 p	4 p
aproximarea plauzibilă a punctului de intersecție a celor trei circumferințe (coordonatelor geografice ale epicentrului): epicentru se află pe teritoriul țărilor din fostă Jugoslavie, în locul de coordonate geografice aproximative $\varphi = 42^0 N$ și $\lambda = 22^0 E$.	1 p	
<p>b) Unda s este o undă transversală, în consecință ea nu apare în regiunea S_1, S_2 dacă se presupune că nucleul este lichid. Astfel numai unda p traversează nucleul lichid al Pământului (unda s se propagă numai prin partea solidă a Pământului)</p>	1 p 1p	2 p


-
1. Orice rezolvare corectă ce ajunge la rezultatul corect va primi punctajul maxim pe itemul respectiv.
 2. Orice rezolvare corectă, dar care nu ajunge la rezultatul final, va fi punctată corespunzător, proporțional cu conținutul de idei prezent în partea cuprinsă în lucrare din totalul celor ce ar fi trebuit aplicate pentru a ajunge la rezultat, prin metoda aleasă de elev.



Olimpiada de Fizică
Etapa pe județ
24 februarie 2007
Barem

XI

Pagina 4 din 4

Subiect 3.	Partial	Punctaj
c) desen	1 p	3 p
		
OT = R _n raza nucleului.	1 p	
OT = R _n = R sin $\frac{\alpha}{2}$	1 p	
Valoarea lui R _n	1 p	
Oficiu		1

-
1. Orice rezolvare corectă ce ajunge la rezultatul corect va primi punctajul maxim pe itemul respectiv.
 2. Orice rezolvare corectă, dar care nu ajunge la rezultatul final, va fi punctată corespunzător, proporțional cu conținutul de idei prezent în partea cuprinsă în lucrare din totalul celor ce ar fi trebuit aplicate pentru a ajunge la rezultat, prin metoda aleasă de elev.