

# Olimpiada Națională de Fizică Târgu Jiu, 24 – 29 aprilie 2017 Proba teoretică



## Subiectul I

### A. Amestec de gaze

Un amestec de  $N$  gaze ideale, cu masele molare  $\mu_i$  ( $i = 1, \dots, N$ ), cunoscute, poate fi caracterizat fie cu ajutorul fracțiilor masice  $w_i = \frac{m_i}{m}$  ( $i = 1, \dots, N$ ), unde  $m$  este masa totală a amestecului, iar  $m_i$  ( $i = 1, \dots, N$ ) este masa componentei  $i$  a acelui amestec, fie cu ajutorul fracțiilor molare  $x_i = \frac{\nu_i}{\nu}$  ( $i = 1, \dots, N$ ), unde  $\nu$  este numărul total de moli ai amestecului, iar  $\nu_i$  este numărul de moli de gaz al componentei  $i$  a acelui amestec.

- Calculează masa molară  $\mu$  a amestecului, cunoscând fracțiile masice  $w_i$ .
- Calculează masa molară  $\mu$  a amestecului, cunoscând fracțiile molare  $x_i$ .

### B. Aer umed

Aerul umed poate fi modelat ca un amestec de gaze ideale (aer uscat și vapori de apă).

Umiditatea relativă  $h$  a aerului la o anumită temperatură se definește prin raportul dintre presiunea  $p_v$  a vaporilor și presiunea maximă  $p_s$  a vaporilor la aceea temperatură (numită presiune a vaporilor saturați):  $h = \frac{p_v}{p_s}$ .

- Calculează fracția molară  $x$  a vaporilor de apă dacă presiunea aerului umed este  $H$ , umiditatea aerului este  $h$ , iar presiunea vaporilor saturați la aceea temperatură este  $p_s$ .
- Cunoscând exponentul adiabatic al aerului uscat  $\gamma_a = \frac{7}{5}$  și al vaporilor de apă  $\gamma_v = \frac{8}{6}$ , dedu expresia matematică a exponentului adiabatic al aerului umed, caracterizat de fracția molară  $x$  a vaporilor de apă.
- Determină expresia matematică care descrie dependența vitezei sunetului  $v = \sqrt{\gamma \frac{RT}{\mu}}$ , de fracția molară  $x$  a vaporilor de apă. În acest fel se poate descrie, indirect, dependența vitezei sunetului de umiditate. Se consideră masa molară a aerului uscat  $\mu_a = 29$  kg/kmol și a vaporilor de apă  $\mu_v = 18$  kg/kmol, iar  $R$  este constanta universală a gazelor ideale.

## Subiectul al II-lea

Un puls triunghiular de lungime  $L$  se propagă cu viteza  $v$ , de la stânga la dreapta, într-o coardă elastică orizontală, nedispersivă și fără pierderi de energie. Fotografiat la momentul  $t = 0$ , pulsul arată ca în Fig. 1. Capătul din dreapta al corzii se află la coordonata  $x = D > L$ .






Fig. 1

- Admițând că reflexia la capătul din dreapta se face fără pierdere de energie, desenează, **pe foaia de răspunsuri**, forma pulsului imediat după ce acesta s-a reflectat complet, în cazurile: capăt fixat, respectiv capăt liber.
- Dacă  $y = f(x)$  este ecuația care descrie forma pulsului la momentul  $t = 0$  (ecuația perturbației transversale), utilizând sistemul de referință legat de puls, la un moment de timp  $t$  oarecare această ecuație devine  $y(x, t) = f(x - vt)$ . Dedu expresia ecuației perturbației care descrie propagarea pulsului după reflexie, în cazul în care capătul din dreapta al corzii este fixat.
- Dedu expresia ecuației perturbației care descrie propagarea pulsului după reflexie, în cazul în care capătul din dreapta al corzii este liber.
- Desenează, **pe foaia de răspunsuri**, forma pulsului în ambele cazuri (capătul din dreapta este fixat, respectiv liber), la momentul la care doar  $2/3$  din puls s-a reflectat.

- Fiecare dintre subiectele 1, 2, respectiv 3 se rezolvă pe o foaie separată care se secretizează.
- În cadrul unui subiect, elevul are dreptul să rezolve în orice ordine cerințele.
- Durata probei este de 3 ore din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi.
- Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar, dar neprogramabile.
- Fiecare subiect se punctează de la 10 la 1 (1 punct din oficiu). Punctajul final reprezintă suma acestora.



# Olimpiada Națională de Fizică Târgu Jiu, 24 – 29 aprilie 2017 Proba teoretică



- e) Un dispozitiv mecanic aduce coarda în poziția din Fig. 1, toate punctele corzii fiind în repaus. La momentul  $t = 0$  coarda este lăsată liberă. Desenează, **pe foaia de răspunsuri**, forma pulsului fotografiat la momentele  $\tau_k = k \frac{L}{6v}$ , unde  $k = 1$ , respectiv  $k = 2$ ?
- f) Se suspendă coarda vertical, lăsând capătul inferior liber. Calculează cum depinde de coordonată viteza de propagare spre capătul liber și accelerația unei mici perturbații produse la capătul superior al corzii. Se cunosc: lungimea  $l$  și masa  $m$  a corzii, precum și accelerația gravitațională  $g$ . Alege originea reperului unidimensional  $Ox$  la capătul superior al corzii. Se neglijează fenomenele care au loc la capătul liber al corzii.

## Subiectul al III-lea

Un corp cu masa  $m$ , considerat punctiform, se poate mișca fără frecări pe o suprafață plană și orizontală, numai de-a lungul axei  $Ox$ . Corpul este legat de un perete vertical prin intermediul unui resort ideal, având constanta elastică  $k_1$ .

- A. La momentul  $t = 0$  resortul este nedeformat, corpul se află în repaus, în originea  $O$  a axei  $Ox$ , iar asupra sa începe să acționeze o forță constantă  $\vec{F}$  (v. Fig. 1).




Fig. 1

- Dedu expresia matematică pentru alungirea maximă a resortului ( $x_m$ ).
- Demonstrează că legea de mișcare a corpului este de forma  $x(t) = A_1 \sin(\omega_1 t + \varphi_1) + B_1$  și scrie expresiile matematice ale constantelor  $A_1, \omega_1, \varphi_1$  și  $B_1$ .
- La momentul  $t_1 = \frac{\pi}{3} \sqrt{\frac{m}{k_1}}$  acțiunea forței  $\vec{F}$  încetează brusc. Dedu noua lege de mișcare a corpului,  $x(t)$ .

- B. În fața corpului, aflat inițial în repaus, se află un perete vertical fix, de care este legat capătul unui alt resort ideal, orizontal, cu constanta elastică  $k_2 = 2k_1$ . Capătul liber al resortului cu constanta elastică  $k_2$  se află la distanța  $l$  de corp. La momentul  $t = 0$  resortul cu constanta elastică  $k_1$  este nedeformat, iar corpului i se imprimă viteza  $v_0 = l \sqrt{\frac{2k_1}{m}}$ , orientată înspre capătul liber al resortului din dreapta (Fig. 2).




Fig. 2

- Dedu expresia timpului după care corpul de masă  $m$  va reveni în poziția inițială ( $\tau$ ).
- Găsește expresia forței medii care acționează asupra corpului pe toată durata contactului său cu resortul al doilea ( $\bar{F}$ ).
- Calculează distanța parcursă de corp în timp de o perioadă ( $L$ ).

**Notă:** Deformările resorturilor, care sunt tot timpul paralele cu axa  $Ox$ , sunt perfect elastice în toate situațiile analizate mai sus. La finalul interacțiunii cu resortul din dreapta, corpul se desprinde de acesta.

Subiecte propuse de:

prof. **Ion TOMA**, CN Mihai Viteazul, București

lect. univ. dr. **Cornel Mironel NICULAE**, Universitatea din București

prof. dr. **Constantin COREGA**, CN Emil Racoviță, Cluj-Napoca

conf. univ. dr. **Sebastian POPESCU**, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

- Fiecare dintre subiectele 1, 2, respectiv 3 se rezolvă pe o foaie separată care se secretizează.
- În cadrul unui subiect, elevul are dreptul să rezolve în orice ordine cerințele.
- Durata probei este de 3 ore din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi.
- Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar, dar neprogramabile.
- Fiecare subiect se punctează de la 10 la 1 (1 punct din oficiu). Punctajul final reprezintă suma acestora.



# Olimpiada Națională de Fizică Târgu Jiu, 24 – 29 aprilie 2017 Proba teoretică

# XI

## *Foaie de răspunsuri pentru Subiectul al II-lea*

*Foaia de răspunsuri trebuie predată împreună cu rezolvarea subiectului. NU-ți scrie numele pe această foaie !*

	Capăt fixat	Capăt liber
a)		
d)		
e)	$k = 1$ 	$k = 2$ 

1. Fiecare dintre subiectele 1, 2, respectiv 3 se rezolvă pe o foaie separată care se secretizează.
2. În cadrul unui subiect, elevul are dreptul să rezolve în orice ordine cerințele.
3. Durata probei este de 3 ore din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi.
4. Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar, dar neprogramabile.
5. Fiecare subiect se punctează de la 10 la 1 (1 punct din oficiu). Punctajul final reprezintă suma acestora.